

Посткоитальный цистит - это воспалительное заболевание мочевого пузыря у женщин, развитие которого связано с половым актом. Из-за индивидуальных особенностей строения тазового дна во время интимной близости создаются благоприятные условия для проникновения условно-патогенных бактерий из влагалища вверх (через уретру в мочевой пузырь).

В ООО «Лечебно-диагностическом центре» проводится эффективное лечение цистита гиалуроновой кислотой. Такой метод позволяет добиться долгосрочного результата, предупреждая распространение бактерий в вышерасположенные отделы мочевой системы. Терапевтическое действие связано с укреплением уретры. Филлер (гиалуроновая кислота) вводится в парауретральную область, уменьшая диаметр наружного отверстия мочеиспускательного канала, тем самым закрывая «входные ворота».

Преимущества введения филлеров при посткоитальном цистите

- 1. Бережливое отношение к тканям**
- 2. Быстрое восстановление**
- 3. Хорошая переносимость**
- 4. Высокая результативность (более 90%)**
- 5. Продолжительный эффект (1,5-2 года)**
- 6. Амбулаторное лечение без госпитализации**

Цель лечения

- Введение гиалуроновой кислоты в парауретральную область притягивает на себя молекулы воды. Это создает дополнительную компрессию. А уменьшение просвета мочеиспускательного канала снижает вероятность проникновения бактерий.

В результате риски попадания бактерий после полового акта в мочевой пузырь становятся практически нулевыми.

Показания

- Введение гиалуроновой кислоты в парауретральную область рекомендовано для предупреждения эпизодов посткоитального цистита у женщин с факторами риска.

Возможность проведения процедуры определяет уролог или урогинеколог после объективного осмотра.

Как проходит лечение

Время проведения процедуры **15-60 минут**

Пребывание в стационаре **не требуется**

Результаты проведения процедуры

после введения филлеров выдается официальный документ, в котором также прописаны подробные рекомендации.

Чтобы предупредить эпизоды посткоитального цистита, записывайтесь на консультацию к урологу в удобные часы. Врач проведет объективный осмотр и определит, возможно ли проведение филлерной коррекции в Вашем случае.

При отсутствии противопоказаний и соблюдении условий подготовки введение гиалуроновой кислоты проводится на амбулаторном приеме.

Длительность лечения посткоитального цистита у женщин гиалуроновой кислотой зависит от сложности клинического случая.

Процедура состоит из 3 основных этапов:

- **Подготовительный этап.** Половые органы уролог обрабатывает антисептиком, чтобы избежать инфекционных осложнений.
- **Основной этап.** Тонкой иглой врач вводит раствор гиалуроновой кислоты в подслизистый слой уретры.
- **Завершающий этап.** Повторно проводится антисептическая обработка половых органов и выполняется тампонирующее.

Подготовка

Перед введением филлеров требуется соблюдать правила подготовки в течение 2-3 суток:

- прекратить употребление алкоголя - спиртные напитки вызывают обезвоживание тканей, поэтому их употребление перед и сразу после процедуры может снижать эффективность лечения;
 - прекратить прием препаратов, которые снижают свертываемость крови (необходима предварительная консультация с врачом);
 - ограничить половые контакты.
-
- Введение гиалуроновой кислоты позволяет избежать развития посткоитального цистита.
 - Эффективность процедуры сохраняется в течение 1,5 - 2 лет.
 - Настало время жить полноценной жизнью - записывайтесь на процедуру в ООО «ЛДЦ» в удобные часы приема!